

یا من اسمہ دواء و ذکرہ شفاء

راهنمای بیمار

هموروئید "پواسیر"



بیمارستان شهدای دهلران

بازنگری 1404



8- هر وقت احساس دفع داشتید به دستشویی بروید و از حبس کردن آن خودداری کنید . هنگام دفع مدفوع از زور زدن خودداری کنید . پس از دفع مدفوع خودتان را با آب گرم بشویید (حتی در تابستان) و بادستمال توالت سفید بدون عطر و بو خشک کنید .

9 - از صابون های معطر جهت شستشو استفاده نکنید زیرا مواد رنگی و معطر سبب تحریک و خارش و خونریزی میشوند .

10- برای کاهش درد و خونریزی کمتر از 5 - 10 روز اول بعد از جراحی به پهلو بنشینید و بخوابید .

11 - در محل های سفت و مرطوب ننشینید . رطوبت سبب خارش و تحریک ناحیه مقعد می شود .

12- تا سه هفته بعد از عمل می توانید فعالیت عادی داشته باشید .

13- در صورتی که بعد از بهبودی کامل باز هم خونریزی شدید داشتید فقط با پزشک خود مشورت کنید و به توصیه دیگران از هر دارویی استفاده نکنید .

برداشتن آپاندیس با عمل جراحی



قبل از عمل

بعد از عمل

bisms.ir

سایت بیمارستان : <https://hospitalshohada.medilam.ac.ir/>

شماره تماس : 08433724441 بخش داخلی

توصیه های بعد از عمل جراحی

1 - بعد از عمل جراحی هموروئید و هنگام اجابت مزاج پانسمان روی قسمت جراحی شده خواهد افتاد که این امر نباید موجب نگرانی بیمار گردد .

2 - بعد از ترخیص می توان استحمام کرد .

3 - ابتدا رژیم غذایی شما مایعات فراوان سوپ سپس رژیم معمولی و پر فیبر است. برای اینکه دچار یبوست نشوید باید از مایعات فراوان سبزیجات میوه آلو، انجیر و ... استفاده کنید .

4 - اگر در 2- 3 روز هفته اول بعد از عمل هنگام دفع خونریزی داشتید نگران نباشید این خونریزی کم کم از بین می رود اگر خونریزی خیلی شدید شد و یا بعد از مدت فوق ادامه یافت حتماً به پزشک خود اطلاع دهید .

5 - پیاده روی برای شما بسیار مفید است .

6 - پس از عمل در هنگام شل و سفت کردن مقعد کمی درد وجود دارد که پس از چند روز تا یک هفته کامل بهبود می یابد .

7 - مصرف آب را به 8 لیوان در روز برسانید.

لوبیا، باقلا و میوه جات وجود داشته و نوع مصنوعی آن پسلیوم نام دارد .

2- نوع غیر محلول در آب که بطور سریع از لوله گوارش عبور می کند و در گندم سبوس دار، غلات کامل نان و سبزیجات موجود است .

جای مواد کم حجم یا بدون فیبر (نان تهیه شده از غلات بدون سبوس شیرینی جات چیس بستنی پنیر و گوشت) از غذاهای حاوی فیبر (میوه، سبزیجات، نان تهیه شده از غلات کامل و سبوس دار) استفاده کنید . بهتر است سبزیجات را خام مصرف کنید چون طبع باعث کاهش فیبر آن ها می شود. از میوه های تازه با پوست خوراکی بیشتر استفاده کنید. پوست میوه سرشار از فیبر است.

توجه

1- روزی سه مرتبه داخل لگن آب گرم و بتادین هر بار به مدت 10-20 دقیقه بشینید و سپس خود را با آب ولرم بشویید و خشک کنید .

2- پس از هر بار اجابت مزاج ناحیه را به خوبی بشویید.

3- از مسکن هایی مانند استامینوفن و بروفن می توان استفاده نمود .

4- از بلند کردن و یا کشیدن وسایل سنگین خودداری نمایید.

علل همروئید

افزایش فشار داخل شکمی موقع دفع مدفوع خشک و یا اسهال طولانی مدت از علل شایع همروئید هستند . خیلی از خانم ها در طی حاملگی دچار همروئید می شوند . نشستن یا ایستادن طولانی می تواند یک عامل باشد . علل دیگر شامل ورزش نکردن، ورزش خیلی سنگین، عادت بیرون روی نادرست (از قبیل زور زدن برای مدفوع یا نشستن بر روی دستشویی برای مدت طولانی) است .

علائم همروئید

1- خونریزی بدون درد که معمولاً همراه با مدفوع و یا پس از دفع بصورت قطره قطره یا خون پاشی خواهد بود. (شایعترین علامت)

2- درد خارش و سوزش 3- لازم به یادآوری است که هر خونریزی از مقعد را نباید به حساب بواسیر گذاشت بلکه توسط پزشک باید بررسی های لازم انجام شود تا علل دیگر نیز رد گردد.

پیشگیری از عود بیماری

1-یبوست ممنوع 2- زور زدن در هنگام دفع ممنوع 3- طهارت با آب گرم 4- از رژیم غذایی پر فیبر استفاده کنید .

فیبر چیست ؟

فیبر بخشی از گیاه است که هضم نشده و باعث ایجاد حجم می شود تا مواد غذایی راحت از لوله گوارش عبور کند که به دو شکل وجود دارد: 1-نوع محلول در آب که ماده ژله ای بوده و در جوی دو سر، نخود

همروئید " بواسیر "

4/2-5 سانتی متر انتهای راست روده کانال مقعدی نامیده می شود. کانال مقعدی با شبکه ای از وریدهای کوچک که درست زیر پوست هستند کشیده می شود. عادت های غیر عادی جهت اجابت مزاج از قبیل زور زدن برای بیرون راندن مدفوع (به خصوص موقع یبوست) یا نشستن طولانی مدت جهت اجابت مزاج، ممکن است باعث بزرگی این وریدها بشود . این ورید های بزرگ شده لایه های متورم بافتی را درست می کند که ما آن ها را همروئید می نامیم . مدفوع سخت ممکن است بواسیر را بیشتر تحریک کرده و آن ها را از کانال مقعدی بیرون براند .

انواع همروئید

همروئید دو نوع داخلی و خارجی دارد. در نوع داخلی بافت متورم در داخل کانال مقعدی قرار داشته و دیده نمی شود و فقط در زمان دفع مدفوع قابل مشاهده است . در نوع خارجی بافت متورم در اطراف مقعد و به رنگ پوست بوده گاهی همراه با خارش بوده و تنها در صورت تشکیل لخته در آن محل بافت درگیر به رنگ تیره درآمده و دردناک می شود.